

# cf bio

## StyriaFert Veggie Plus P+S

Engrais végétaux organiques NPK pour les produits des champs, les fruits, les légumes et la viticulture

### Composition nutritionnelle

|     |                               |                               |
|-----|-------------------------------|-------------------------------|
| 6 % | N                             | azote total organiquement lié |
| 1 % | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | phosphate total               |
| 5 % | K <sub>2</sub> O              | oxyde de potassium total      |

### Composants auxiliaires

|       |    |                 |
|-------|----|-----------------|
| 0,9 % | Mg | magnésium total |
| 5 %   | S  | soufre total    |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 85 %         | matière organique |
| Rapport C/N  | 6 : 1             |
| Valeur du pH | 5                 |

### Matières premières

Résidus végétaux issus de la production d'énergie, sulfate de potassium, potasse magnésienne (Patentkali)

### Mode d'action et bénéfices

- › agit même sur les sols à basse température
- › excellente disponibilité des nutriments pour les plantes
- › potassium et soufre sous forme soluble dans l'eau
- › formulation végétale
- › mise à profit des sources nutritives disponibles précédemment mises en œuvre pour des économies d'engrais
- › moins de travail grâce à la combinaison d'éléments nutritifs
- › limite les pertes de nutriments par lixiviation
- › améliore la structure des sols
- › entretient durablement la fertilité des sols
- › favorise la formation d'humus et améliore ainsi la santé des sols
- › forte capacité de rétention de l'eau
- › odeur agréable
- › épandage facile, dissolution rapide
- › fabriqué en Autriche





## Utilisation

Épandage avec un appareil standard. L'incorporation en surface de StyriaFert Veggie Plus P+S permet d'obtenir de meilleurs résultats. Les précipitations après l'épandage accélèrent son action. Selon l'humidité du sol et les conditions météorologiques, l'épandage produit ses premiers effets après une ou deux semaines.

**Domaine d'utilisation:** culture de plein champ, culture maraîchère, culture fruitière, viticulture et horticulture

|                            |                              |             |       |                          |
|----------------------------|------------------------------|-------------|-------|--------------------------|
| <b>Fruits</b>              | Jeunes cultures              | 400 – 600   | kg/ha | printemps                |
|                            | Cultures en production       | 600 – 700   | kg/ha | printemps                |
|                            | Baies                        | 600 – 700   | kg/ha | printemps                |
| <b>Légumes</b>             | Épinards                     | 1200 – 1400 | kg/ha | avant la mise en culture |
|                            | Choux rouges et choux blancs | 1600 – 2000 | kg/ha | avant la mise en culture |
|                            | Légumineuses                 | 500 – 700   | kg/ha | avant la mise en culture |
|                            | Tomates                      | 700 – 900   | kg/ha | avant la mise en culture |
|                            | Poivrons                     | 700 – 900   | kg/ha | avant la mise en culture |
|                            | Courges                      | 600 – 700   | kg/ha | avant la mise en culture |
| <b>Produits des champs</b> | Pommes de terre              | 800 – 1600  | kg/ha | avant la mise en culture |
|                            | Maïs                         | 1100 – 1300 | kg/ha | avant la mise en culture |
|                            | Betteraves à sucre           | 700 – 1000  | kg/ha | avant la mise en culture |
| <b>Viticulture</b>         |                              | 400 – 600   | kg/ha | printemps                |

## Conditions de stockage

Entreposer dans un endroit sec et frais, non exposé à la lumière directe du soleil. Maintenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Le produit peut être conservé pendant plusieurs mois sans perte de qualité si les conditions de stockage sont respectées.

## Densité en vrac

- › 740 kg/m<sup>3</sup>
- › en pellets ou en granulés

## Lot

- › 1 x 1000 kg BigBag
- › 2 x 500 kg BigBag
- › 40 x 25 kg Sac